

VADEMECUM



MARCA	PRESENTACIÓN	PAMI	ACCIÓN TERAPÉUTICA
ANALERG LEVOCETIRIZINA	5 mg x 10 Comp. recubiertos 5 mg x 30 Comp. recubiertos	✓ ✓	Antihistamínico potente y selectivo de rápida acción y buen perfil de seguridad en una toma diaria.
Arlamide ARIPIPAZOL	5 mg x 30 Comprimidos 10 mg x 30 Comprimidos 15 mg x 30 Comprimidos	✓ ✓ ✓	Antipsicótico estabilizador dopaminérgico. Selectividad funcional postsináptica que permite adaptarse a las necesidades del paciente con perfil favorable de seguridad y tolerabilidad.
Axokine HIDROXICLOROQUINA	200 mg x 30 Comprimidos 200 mg x 60 Comprimidos	✓ ✓	Inmunomodulador con un adecuado balance en el control de la respuesta inmune. Piedra angular del tratamiento del lupus en todas las etapas: aumenta la sobrevida, reduce la actividad de la enfermedad, los brotes y el daño orgánico acumulado.
Azatioprina Rontag AZATIOPRINA	50 mg x 25 Comprimidos 50 mg x 100 Comprimidos	-- ✓	Eficaz alternativa de inmunosupresión con alta experiencia de uso que permite reducir dosis de corticoesteroides.
D.A.P.S. DAPSONA	100 mg x 100 Comprimidos	✓	Antibacteriano para el tratamiento de la lepra, dermatitis herpetiforme, y activo contra plasmodium y pneumocystis carinii.
Defas DEFLAZACORT	6 mg x 20 Comprimidos 30 mg x 20 Comprimidos	✓ ✓	Corticoide con menor compromiso óseo y del metabolismo de la glucosa, menos aumento de peso, que permite en una sola toma diaria ajustar a la dosis exacta que el paciente necesita.
Intensit MODAFINILO	200 mg x 10 Comp. ranurados 200 mg x 20 Comp. ranurados	✓ --	Psicoestimulante con buen perfil de seguridad. Bajo potencial de abuso. No altera la arquitectura del sueño.
Lefluar LEFLUNOMIDA	20 mg x 30 Comprimidos	✓	Inmunosupresor selectivo. Agente antirreumático modificador de la enfermedad en artrosis psoriásica y artritis reumatoidea.
LEVRON LEVETIRACETAM	500 mg x 20 Comp. recubiertos 500 mg x 60 Comp. recubiertos 1000 mg x 30 Comp. recubiertos 1000 mg x 60 Comp. recubiertos	100% 100% 100% --	Antiepiléptico eficaz de amplio espectro. Fácil y rápida titulación sin requerir monitoreo plasmático. Sin interacciones clínicamente importantes. Buen perfil de seguridad.
MODINA FINGOLIMOD	0,5 mg x 28 Cápsulas	--	Terapia modificadora en esclerosis múltiple que reduce la frecuencia de recidivas y retrasa la progresión de la discapacidad.
Naprontag NAPROXENO	500 mg x 20 Comprimidos 500 mg x 50 Comprimidos 500 mg x 100 Comprimidos *	✓ ✓ --	Potente AINE de efecto prolongado en 1 o 2 tomas diarias, con menos fluctuaciones en los niveles sanguíneos. Avalado por años de evidencia científica y numerosas guías de tratamiento.
Naprontag 24 NAPROXENO	750 mg x 10 Comp. lib. controlada 750 mg x 30 Comp. lib. controlada	✓ ✓	Potente efecto analgésico con la comodidad de una toma diaria y las ventajas del naproxeno, un AINE cada vez más utilizado.
Naprontag Gestic NAPROXENO SÓDICO	550 mg x 20 Comp. recubiertos	✓	AINE de rápida acción de comienzo en 15 minutos y efecto prolongado en una o dos tomas diarias para dolores osteomusculares, dismenorrea y migraña.
Nubaina NALBUFINA	10 mg - 1ml x 5 Ampollas-PSI-L.IV* 10 mg - 1ml x 10 Ampollas-PSI-L.IV* 20 mg - 1ml x 10 Ampollas-PSI-L.IV*	✓ ✓ ✓	Opiáceo de rápida acción analgésica para dolores intensos con mejor perfil de seguridad que otros opioides, menor depresión respiratoria, mejor estabilidad hemodinámica y tolerancia.

1. Targas Yacubian EM et al. Tratamiento Farmacológico de las Epilepsias. 2014. ALADE Z, Lacour M. Histamine and Betahistine in the Treatment of Vertigo. J of Vestibular Research 2015; 23, 139-51. 2. Gordeuk VR et al. Carbonyl iron therapy for iron deficiency anemia. Blood 1986; 67:3245-52. 3. Sociedad Argentina de Hematología. Guías de Diagnóstico y Tratamiento, 2021. 4. Hair PT, Scott LJ. Levocetirizine: a review of its use in the management of allergic rhinitis and skin allergies. Drugs 2006;66(7):973-96. 5. Zheng Zeng et al. A Comparison of Nalbuphine with Morphine for Analgesic Effects and Safety: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. So Rep 2015; 5: 10927. 6. Solanki RN et al. Comparative Study of Intravenous Nalbuphine HCl and Tramadol HCl for Post-Operative Pain Relief Following Orthopaedic Surgeries. Asian Pac. J. Health Sci 2015; 2(1): 155-60. 7. Ganapati A et al. Head to head comparison of adverse effects and efficacy between high dose deflazacort and high dose prednisolone in systemic lupus erythematosus. Lupus 2018;27(6):890-98. 8. Roth T et al. Evaluation of the Safety of Modafinil for Treatment of Excessive Sleepiness. J Clin Sleep Med 2007;6(5):595-602. 9. Danza A et al. Hidroxicloroquina en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Rev Med Chile 2016; 144: 232-240. 10. Ziemssen T et al. Long-term real-world effectiveness and safety of fingolimod over 5 years in Germany. Journal of Neurology (2022) 269:3276-3285. 11. Llorca PM et al. Place of the partial dopamine receptor agonist aripiprazole in the management of schizophrenia in adults: a Delphi consensus study. BMC Psychiatry 2022; 22:364. 12. Mallet J et al. Major Depressive Disorder (MDD) and Schizophrenia - Addressing Unmet Needs With Partial Agonists at the D2 Receptor: A Review. Int J of Neuropsychopharmacology 2019; 22(10), 651-64. 13. Chao Zeng et al. Initial analgesic prescriptions for osteoarthritis in the United Kingdom, 2000-2016. Rheumatology 2020;1-13 * Para uso hospitalario.

MARCA	PRESENTACIÓN	PAMI	ACCIÓN TERAPÉUTICA
Ronistina® BETAHISTINA	8 mg x 30 Comprimidos 8 mg x 60 Comprimidos 16 mg x 30 Comprimidos 16 mg x 60 Comprimidos	✓ ✓ ✓ ✓	Antivertiginoso de buena tolerancia que no produce sedación y permite la recuperación vestibular.
Ronistina® dúo BETAHISTINA	24 mg x 30 Comprimidos 24 mg x 60 Comprimidos	✓ ✓	Antivertiginoso de buena tolerancia que no produce sedación y permite la recuperación vestibular.
Ronistina® dúo MD BETAHISTINA	24 mg x 30 Comp. birranurados	--	Antivertiginoso de buena tolerancia en comprimidos multidosis que permite ajustar la dosis en forma simple a los requerimientos diarios.
YECTAFÉR Tabs HIERRO + ÁCIDO FÓLICO	40/0.5 mg x 20 Comp. recubiertos 40/0.5 mg x 40 Comp. recubiertos 80/1 mg x 20 Comp. recubiertos 80/1 mg x 40 Comp. recubiertos	100% 100% 100% 100%	Hierro micronizado sin agregado de sales + ácido fólico con una asimilación gradual y un pequeño comprimido que permite una mejor tolerancia.
Yectafer® HIERRO 5% ** **Como Hierro Dextrano de bajo Peso Molecular	5 Ampollas x 2 ml 10 Ampollas x 2 ml	✓ ✓	Hierro intramuscular, una opción rápida y simple para reponer hierro en forma ambulatoria cuando la vía oral no es posible. Más cómodo para el paciente y con menos costos hospitalarios.
Yectafer Complex® HIERRO 5% (**)+ ÁCIDO FÓLICO 1 mg + HIDROXOCOBALAMINA 0,1 mg	5 Ampollas x 2 ml 10 Ampollas x 2 ml	✓ ✓	Asociación inteligente que cubre las 3 carencias más frecuentes cuando la anemia es pluricarenal. Su administración intramuscular permite, cuando la vía oral no es posible, una opción rápida y simple de reposición, más cómoda para el paciente sin estadías hospitalarias.

EN ARTRITIS REUMATOIDEA Y ARTRITIS PSORIÁSICA

En artritis psoriásica

Un metanálisis ha mostrado que leflunomida es un tratamiento efectivo y bien tolerado ⁽¹⁾

77%
DE LOS PACIENTES

lograron una respuesta PsARC*

*Psoriatic Arthritis Response Criteria

Leflunomida mejoró significativamente la calidad de vida de los pacientes con artritis psoriásica vs. placebo:

(Estudio TOPAS)

- En síntomas o sensaciones (p:0,0092)
- En actividad diaria (p:0,013)
- En relación personal (p:0,030)

Leflunomida en artritis psoriásica una opción de primera línea ⁽²⁾

REFERENCIAS:

1. Qiaoding Dai et al. Efficacy and safety of leflunomide in psoriatic arthritis treatment: A single-arm meta-analysis. Int J Rheum Dis. 2019 Aug;22(8):1498-1505
2. Ingrid Möller. Eficacia del tratamiento con leflunomida en pacientes con artritis psoriásica. Seminarios de la Fundación Española de Reumatología. Vol. 10. Issue 2, pages 48-52 (Abril 2009)

Lefluar
LEFLUNOMIDA



la vida en movimiento