

# VADEMECUM



MARCA	PRESENTACIÓN	PAMI	ACCIÓN TERAPÉUTICA
<b>ANALERG</b> LEVOCETIRIZINA	5 mg x 10 Comp. rec. ranurados 5 mg x 30 Comp. rec. ranurados	✓ ✓	Antihistamínico potente y selectivo de rápida acción y buen perfil de seguridad en una toma diaria.
<b>Arlemide</b> ARIPIPAZOL	5 mg x 30 Comp. ranurados 10 mg x 30 Comp. ranurados 15 mg x 30 Comp. ranurados	✓ ✓ ✓	Antipsicótico estabilizador dopaminérgico. Selectividad funcional postsináptica que permite adaptarse a las necesidades del paciente con perfil favorable de seguridad y tolerabilidad.
<b>Axokine</b> HIDROXICLOROQUINA	200 mg x 30 Comp. recubiertos 200 mg x 60 Comp. recubiertos	✓ ✓	Inmunomodulador con un adecuado balance en el control de la respuesta inmune. Piedra angular del tratamiento del lupus en todas las etapas: aumenta la sobrevida, reduce la actividad de la enfermedad, los brotes y el daño orgánico acumulado.
<b>Azatioprina Rontag</b> AZATIOPRINA	50 mg x 25 Comprimidos 50 mg x 100 Comprimidos	-- ✓	Eficaz alternativa de inmunosupresión con alta experiencia de uso que permite reducir dosis de corticoesteroides.
<b>D.A.P.S.</b> DAPSONA	100 mg x 100 Comprimidos	✓	Antibacteriano para el tratamiento de la lepra, dermatitis herpetiforme, y activo contra plasmodium y pneumocystis carinii.
<b>Defas</b> DEFLAZACORT	6 mg x 20 Comp. ranurados cuatrisesectados 30 mg x 20 Comp. ranurados cuatrisesectados	✓ ✓	Corticoide con menor compromiso óseo y del metabolismo de la glucosa, menos aumento de peso, que permite en una sola toma diaria ajustar a la dosis exacta que el paciente necesita.
<b>Intensit</b> MODAFINILO	200 mg x 10 Comp. ranurados 200 mg x 20 Comp. ranurados	✓ --	Psicoestimulante con buen perfil de seguridad. Bajo potencial de abuso. No altera la arquitectura del sueño.
<b>Lefluar</b> LEFLUNOMIDA	20 mg x 30 Comp. rec. ranurados	✓	Inmunosupresor selectivo. Agente antirreumático modificador de la enfermedad en artritis psoriásica y artritis reumatoidea.
<b>LEVRON</b> LEVETIRACETAM	500 mg x 20 Comp. rec. ranurados 500 mg x 30 Comp. rec. ranurados 500 mg x 60 Comp. rec. ranurados 1000 mg x 30 Comp. rec. ranurados 1000 mg x 60 Comp. rec. ranurados	100% -- 100% 100% --	Antiepiléptico eficaz de amplio espectro. Fácil y rápida titulación sin requerir monitoreo plasmático. Sin interacciones clínicamente importantes. Buen perfil de seguridad.
<b>MODINA</b> FINGOLIMOD	0,5 mg x 28 Cápsulas	--	Terapia modificadora en esclerosis múltiple que reduce la frecuencia de recidivas y retrasa la progresión de la discapacidad.
<b>Naprontag</b> NAPROXENO	500 mg x 10 Comp. ranurados 500 mg x 20 Comp. ranurados 500 mg x 50 Comp. ranurados 500 mg x 100 Comp. ranurados *	-- ✓ ✓ --	Potente AINE de efecto prolongado en 1 o 2 tomas diarias, con menos fluctuaciones en los niveles sanguíneos. Avalado por años de evidencia científica y numerosas guías de tratamiento.
<b>Naprontag 24</b> NAPROXENO	750 mg x 10 Comp. lib. prolongada 750 mg x 30 Comp. lib. prolongada	✓ ✓	Potente efecto analgésico con la comodidad de una toma diaria y las ventajas del naproxeno, un AINE cada vez más utilizado.
<b>Naprontag Gesic</b> NAPROXENO SÓDICO	550 mg x 10 Comp. rec. ranurados 550 mg x 20 Comp. rec. ranurados	✓ ✓	AINE de rápida acción de comienzo en 15 minutos y efecto prolongado en una o dos tomas diarias para dolores osteomusculares, dismenorrea y migraña.
<b>Nubaina</b> NALBUFINA	10 mg - 1ml x 5 Ampollas-PSI-L.IV* 10 mg - 1ml x 10 Ampollas-PSI-L.IV* 20 mg - 1ml x 10 Ampollas-PSI-L.IV*	✓ ✓ ✓	Opiáceo de rápida acción analgésica para dolores intensos con mejor perfil de seguridad que otros opiáceos, menor depresión respiratoria, mejor estabilidad hemodinámica y tolerancia.

\*PSI-L.IV: Producto Psicotrópico lista IV

1. Targas Yacubian EM et al. Tratamiento farmacológico de las Epilepsias. 2014. ALADE Z, Lacour M. Histamine and Betahistine in the Treatment of Vertigo. J of Vestibular Research 2013; 23, 139-51. 3. Gordeuk VR et al. Carbonyl iron therapy for iron deficiency anemia. Blood 1986; 67:3,745-52. 4. Sociedad Argentina de Hematología, Guías de Diagnóstico y Tratamiento, 2021. 5. Hair PT, Scott LJ. Levocetirizine: a review of its use in the management of allergic rhinitis and skin allergies. Drugs 2006;66(7):975-96. 6. Zheng Zeng et al. A Comparison of Nalbuphine with Morphine for Analgesic Effects and Safety: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Sci Rep 2015; 5: 10927. 7. Solanki RN et al. Comparative Study of Intravenous Nalbuphine HCl and Tramadol HCl for Post-Operative Pain Relief Following Orthopaedic Surgeries. Asian Pac. J. Health Sci 2015; 2(1): 155-60. 8. Ganapati A et al. Head to head comparison of adverse effects and efficacy and efficacy and safety of high dose deflazacort and high dose prednisolone in systemic lupus erythematosus. Lupus 2018;27(6):890-98. 9. Roth T et al. Evaluation of the Safety of Modafinil for Treatment of Excessive Sleepiness. J Clin Sleep Med 2007;3(6):595-602. 10. Danza A et al. Hidroxicloroquina en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Rev Med Chile 2016; 144: 232-240. 11. Ziemssen T et al. Long-term real-world effectiveness and safety of fingolimod over 5 years in Germany. Journal of Neurology (2022) 269:3276-3285. 12. Ulorca PM et al. Place of the partial dopamine receptor agonist aripiprazole in the management of schizophrenia in adults: a Delphi consensus study. BMC Psychiatry 2022; 22: 364. 13. Mallet J et al. Major Depressive Disorder (MDD) and Schizophrenia - Addressing Unmet Needs With Partial Agonists at the D2 Receptor: A Review. Int J of Neuropsychopharmacology 2019; 22(10): 651-64. 14. Chao Zeng et al. Initial analgesic prescriptions for osteoarthritis in the United Kingdom, 2000-2016. Rheumatology 2020;19: 15. Hattori N et al. Expert Opinion on Drug Safety, 2023 16. Zhang Z et al. Translational Neurodegeneration (2018) 7:14. 17. Mutti C et al. Neurological Sciences (2022) 43:4791-4796. 18. Hsaini M et al. JAD 6 (2022) 100205. 19. Cipriani A. et al. Lancet 2019; 373:746-58. \* Para uso hospitalario.

MARCA	PRESENTACIÓN	PAMI	ACCIÓN TERAPÉUTICA
<b>RASAX</b> RASAGILINA	1 mg x 30 Comp. ranurados	✓	Alta eficacia y adecuado perfil de seguridad en todas las etapas de la Enfermedad de Parkinson demostrados a largo plazo, tanto en monoterapia o asociado a levodopa. Mostró menos alteraciones del sueño y menos discinesias permitiendo una mejor calidad de vida.
<b>Ronistina®</b> BETAHISTINA	8 mg x 30 Comprimidos 8 mg x 60 Comprimidos 16 mg x 30 Comprimidos 16 mg x 60 Comprimidos	✓ ✓ ✓ ✓	Antivertiginoso de buena tolerancia que no produce sedación y permite la recuperación vestibular.
<b>Ronistina® dúo</b> BETAHISTINA	24 mg x 30 Comprimidos 24 mg x 60 Comprimidos	✓ ✓	
<b>Ronistina® dúo MD</b> BETAHISTINA	24 mg x 30 Comp. birranurados	--	Antivertiginoso de buena tolerancia en comprimidos multidosis que permite ajustar la dosis en forma simple a los requerimientos diarios.
<b>Serlina®</b> SERTRALINA	50 mg x 30 Comp. ranurados 100 mg x 30 Comp. ranurados cuatrisesectados	✓ ✓	Inhibidor potente y selectivo de la recaptación neuronal de serotonina indicado en trastorno depresivo mayor, de pánico, de estrés postraumático, TOC y ansiedad social. Destacado por extensa evidencia con un excelente equilibrio entre eficacia, aceptabilidad y perfil de seguridad que lo convierte en uno de los más elegidos a nivel internacional.
<b>YECTAFER Tabs</b> HIERRO + ÁCIDO FÓLICO	40/0.5 mg x 20 Comp. recubiertos 40/0.5 mg x 40 Comp. recubiertos 80/1 mg x 20 Comp. recubiertos 80/1 mg x 40 Comp. recubiertos	100% 100% 100% 100%	Hierro micronizado sin agregado de sales + ácido fólico con una asimilación gradual y un pequeño comprimido que permite una mejor tolerancia.
<b>Yectafer®</b> HIERRO 5% ** **Como Hierro Dextrano de bajo Peso Molecular	5 Ampollas x 2 ml 10 Ampollas x 2 ml	✓ ✓	Hierro intramuscular, una opción rápida y simple para reponer hierro en forma ambulatoria cuando la vía oral no es posible. Más cómodo para el paciente y con menos costos hospitalarios.
<b>Yectafer Complex®</b> HIERRO 5% (**) + ÁCIDO FÓLICO 1 mg + VITAMINA B12 0,1 mg	5 Ampollas x 2 ml 10 Ampollas x 2 ml	✓ ✓	Asociación inteligente que cubre las 3 carencias más frecuentes cuando la anemia es pluricausal. Su administración intramuscular permite, cuando la vía oral no es posible, una opción rápida y simple de reposición, más cómoda para el paciente sin estadías hospitalarias.

**INCLUIDOS**



**LEVRON®**  
LEVETIRACETAM

**RASAX**  
RASAGILINA

**Lefluar**  
LEFLUNOMIDA

**Serlina®**  
SERTRALINA

**Arlemide®**  
ARIPIPAZOL

**Intensit**  
MODAFINILO

**INCLUIDOS**



**Serlina®**  
SERTRALINA

**Arlemide®**  
ARIPIPAZOL

**Intensit**  
MODAFINILO